


Anti human TR4 mouse monoclonal antibody

TR4: Tasticular receptor 4


製品コード	PP-H0107B-00
Clone No.	H0107B
Lot.	A-1
濃度	1mg/mL
容量	100 μ L
Ig class	G2a
Nomenclature	NR2C2
Genebank	L27586
由来	ヒトTR4(23-52 aa)のBaculovirus発現物を免疫したBALB/cマウスの脾臓細胞と、マウスミエロマ細胞(NS-1)を融合して得たハイブリドーマを、BALB/cマウスに接種して得られた腹水。
特異性	ヒトTR4と特異的に反応する。マウスおよびラットTR4と交差反応する。
精製法	硫酸塩析法
溶媒	生理的食塩水(防腐剤として0.1% Na ₃ 添加)

Application 使用濃度は実験にあわせて至適化が必要です。

Western Blot	可 参考使用濃度 2 μ g/mL
非還元 Western Blot	未検討 参考使用濃度 -
ELISA	可 参考使用濃度 0.1 μ g/mL (A450=0.2)
免疫沈降	可 参考使用濃度 適宜調整してください
Supershift Assay	未検討 参考使用濃度 -
クロマチン免疫沈降	未検討 参考使用濃度 -
免疫染色	可 参考使用濃度 10 μ g/mL



ラット 小脳
プルキンエ細胞・顆粒細胞



ラット 精巣
精母細胞・精娘細胞

保存方法 1ヶ月程度の保存の場合は、2~8°Cで保存可能です。長期保存の場合は、抗体を小分けした上で、-20°C以下での保存をお勧めします。また、凍結融解を繰り返すと、抗体が劣化し、本来の性能が得られない場合があるため、お避けください。

参考文献

備考 溶媒に含まれるNa₃は、鉛や銅と反応し爆発性化合物を形成する恐れがあります。廃棄の際には大量の水と一緒に希釈して廃棄してください。

FOR RESEARCH ONLY. NOT FOR USE IN HUMANS.

本製品は研究目的のみで使用することができます。人やそのほか動物の疾病診断、治療・予防に使用することはできません。研究目的以外で使用する場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。

MADE IN JAPAN

Aug 29, 2006